



Forma de árbol

● Forma biológica

🌳 Es un árbol mediano que puede desarrollar alturas de hasta 20 m.



Corteza lisa y gris

NOMBRE CIENTÍFICO: *Ocotea disjuncta* (Schltld.) Walp.

NOMBRE COMÚN: **Vara negra**

FAMILIA: Lauraceae

Claudia Gallardo-Hernández. *INECOL*
Tarin Toledo-Aceves. *INECOL*



● Distribución



Endémica de México (Guerrero, Oaxaca y Veracruz).

Se desarrolla en bosque de niebla, entre 1700 y 2500 m s.n.m.

● Categoría de amenaza

VU Vulnerable (IUCN, 2021).

En peligro (González-Espinoza et al. 2011). Para Veracruz, el cambio de uso de suelo y el uso de la especie la pone en riesgo.

● Flora y fauna asociada

Sus frutos son consumidos por aves.



Descripción

Hojas alternas, elíptico lanceoladas, de 8 a 15 cm de largo, con el ápice acuminado y la base ligeramente oblicua, haz de un color verde oscuro y envés con presencia de pequeñas cámaras en las axilas de las hojas (domacios) en al menos en dos o tres de las venas axilares.

Flores hermafroditas diminutas, tomentosas y dispuestas en una panícula.

Frutos son drupas elipsoides de 3 cm de largo, negros y sostenidos por una cúpula roja.



Usos



La madera por su veta tan especial se emplea en la fabricación de muebles, y en la construcción de tipo rural y para leña.



Propagación



Plántulas en vivero

Frutos negros con cúpula roja indican un estado de madurez adecuado para colectarse.

La semilla lavada se deja secar en un lugar sombreado y ventilado por 3 días y se procede a sembrarlas sin ningún tratamiento pregerminativo. No se recomienda remojar las semillas previo a su siembra pues aumenta la pudrición. En un periodo de 40 a 80 días comenzarán a emerger las plántulas.

Las plántulas son sensibles al sol directo por lo que se deben colocar en un almácigo bajo malla sombra y regarlas cada 3 a 5 días. La germinación puede alcanzar 65 %.

Las plantas se pueden tranplantar cuando tengan 5 cm de altura a bolsas de 18 x 25 cm y se sugiere que permanezcan bajo malla sombra del 50 % por 1 año o hasta que alcancen los 70 cm de altura antes de sembrarlas en un lugar definitivo.

Datos curiosos

Es un árbol perenne cuya floración ocurre de junio a agosto y su fructificación entre los meses de enero a marzo.

Referencia: